

COMPARAÇÃO DA DIETA ENTERAL PRESCRITA EM RELAÇÃO À ADMINISTRADA DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Naylla Cristina Navarro Figueiredo¹. Karin Rios Perpétuo². ThaisBatistoneTentor de Barros².
FernandaGolçalvesGuidetti Hoelis³. Natália Baraldi Cunha¹

¹Centro de Ciências da Saúde – Universidade do Sagrado Coração -
naylla.cristina@hotmail.com; nataliabcunha@gmail.com

²Hospital de Base de Bauru FAMESP

karinriosperpetuo@hotmail.com; thaistentor@hotmail.com;

³Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP

fernandaguidetti@gmail.com

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária

Agência de fomento: Não há

Área do conhecimento: Saúde – Nutrição

Comparou-se o volume de dieta enteral prescrita e a infundida em pacientes da UTI antes e após a exposição dos dados para equipe. Após aprovação pelo Comitê de Ética (2.527.241), a coleta de dados foi realizada no Hospital de Base de Bauru. As informações dos volumes e os motivos para interrupção da dieta foram coletadas através dos prontuários. Os dados foram apresentados a equipe, e uma reavaliação foi feita. Das 260 prescrições avaliadas na primeira etapa, 32,6% receberam menos que 80% da dieta prescrita ($p < 0,001$). O módulo de proteína também foi menor que o prescrito ($p = 0,005$), assim como a proteína total (dieta+módulo) ($p < 0,001$), sendo que em 30,3% foi ofertado menos que 80% do prescrito. Os motivos de não infusão da dieta foram: não atingiu o volume prescrito sem justificativa 46,6%; drenando/sonda aberta 17,79%; parada para realização de exames 11%. A segunda etapa apresentou valores semelhantes à primeira ($p < 0,001$). Das 263 prescrições avaliadas 27,3% receberam menos que 80% do volume da dieta prescrito ($p < 0,001$). O módulo de proteína infundido também foi significativamente menor que o prescrito ($p < 0,001$), assim como da proteína total ($p < 0,001$) ofertada em quantidade inferior a 80% que o prescrito, em 39,1%. Os motivos de não infusão da dieta foram: não atingiu o volume prescrito sem justificativa 33,7%; complicações do TGI 23,2%; parada para realização de exames 15,1%. As porcentagens de infusão da dieta e proteína avaliadas antes e após a apresentação, não mostraram diferença estatística, mas houve uma melhora nas anotações dos motivos das interrupções.

Palavras-chave: Nutrição enteral. Terapia nutricional