



## **CORRELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE SABURRA LINGUAL E A CONDIÇÃO SISTÊMICA DO PACIENTE: ESTUDO RETROSPECTIVO**

Leticia Fantim Ferreira<sup>1</sup>; Camila Lopes Cardoso<sup>1</sup>; Joel Ferreira Santiago Júnior<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Área de Ciências da Saúde – Centro Universitário Sagrado Coração  
[ferreira-leticia@hotmail.com](mailto:ferreira-leticia@hotmail.com); [cardoso\\_lopes@yahoo.com.br](mailto:cardoso_lopes@yahoo.com.br); [jf.santiagojunior@gmail.com](mailto:jf.santiagojunior@gmail.com)

Tipo de Pesquisa: Iniciação Científica voluntária - PIVIC

Área do conhecimento: Saúde – Odontologia

A saburra lingual pode ser definida como uma camada branco-amarelada ou acastanhada visível clinicamente no dorso da língua. O objetivo deste estudo foi avaliar a presença de saburra lingual e a condição sistêmica do paciente. A avaliação retrospectiva de prontuários de pacientes da Clínica de Estomatologia da Unisagrado foi realizada por um examinador no intuito de incluir somente pacientes que apresentaram saburra lingual. Numa amostra total de 680 prontuários investigados, 104 (15,3%) foram incluídos no estudo, os quais apresentaram saburra lingual. Considerando o gênero avaliado, os resultados revelaram 56 mulheres (53,8%) e 48 homens (46,2%). A média de idade da população estudada foi 49,6. Trinta pacientes (28,84%) eram tabagistas, sendo 12 do gênero masculino e 18 feminino. Com relação a presença de problemas sistêmicos, 57 (54,81%) pacientes apresentaram algum tipo de doença sistêmica. Considerando o uso de medicação, 45 (43,26%) pacientes faziam o uso de pelo menos algum tipo de medicamento. Os medicamentos para controle problemas cardiovasculares, como a hipertensão, foram os mais frequentes, acompanhando também a maior frequência da doença. Não houve diferença estatisticamente significativa quando correlacionada a idade com o tabagismo através do teste t ( $p=0,267$ ). Através do teste quadrado foi possível avaliar a proporção de gênero e tabagismo, a qual não foi estatisticamente significativa ( $p=0,559$ ). Analisando a influência da idade no gênero também revelou ausência de significância ( $p=0,879$ ). A observação do uso de medicamentos e doenças sistêmicas foi bastante comum nos pacientes avaliados, indicando que esses fatores podem ser contribuintes no processo de formação da saburra lingual.

Palavras-Chave: Saburra lingual. condição sistêmica. saúde bucal.