



## **IMPLANTE ZIGOMÁTICO SUBMETIDO A CARGA IMEDIATA PARA REABILITAÇÃO DE MAXILA ATRÓFICA. 7 ANOS DE ACOMPANHAMENTO**

Catharina Machado Kamimura<sup>1</sup>; Paulo Felipe dos Santos Ribeiro<sup>2</sup>; Gustavo Henrique Souza Silva<sup>3</sup>; Fernanda Rayssa da Silva Pereira<sup>4</sup>; Raquel Damazia da Silva; Jéssica Lemos Gulinelli<sup>5</sup>; Pâmela Leticia dos Santos<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Aluna de Graduação, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo, Brasil.-catharina\_kamimura@hotmail.com

<sup>2</sup>Aluno de Graduação, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo, Brasil

<sup>3</sup>Mestre em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Curso de Odontologia, Universidade São Leopoldo Mandic, Campinas, SP, Brasil.

<sup>4</sup>Cirurgiã Dentista, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, São Paulo, Brasil.

<sup>5</sup>Profª. Dra. Área de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP, Brasil.

<sup>6</sup>Profª. Dra. Área de Implantodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP, Brasil

O aumento da expectativa de vida faz com haja um maior número de idosos procurando atendimento odontológico para a reabilitação implantossuportada com o objetivo de restaurar a função e a estética da cavidade bucal. Todavia, a maioria desses pacientes perderam os dentes há um longo período possuindo uma reabsorção óssea severa e pneumatização do seio maxilar. Assim, o presente estudo teve como objetivo demonstrar, através da descrição do caso clínico, o tratamento com implantes zigomáticos como uma alternativa para tratar maxilas severamente atróficas. No caso clínico estudado, a paciente apresentou, na avaliação clínica e de imagem severa atrofia óssea alveolar, com perda em altura e espessura, além de grande pneumatização dos seios maxilares bilateralmente. Foi proposta a técnica clássica de fixação zigomática, com dois implantes convencionais anteriores e dois implantes zigomáticos na região posterior com colocação de prótese implantossuportada com carga imediata. A paciente foi acompanhada por um período de 7 anos, não possuindo queixas álgicas, ausência de infecção e perda de implante. Baseado no caso clínico estudado, conclui-se que os implantes zigomáticos são uma opção satisfatória para auxiliar a reabilitação implantossuportada de maxilas atróficas.

**Palavras-chave:** Zigoma. Implantes dentários. Reabilitação bucal.