



DIFERENÇAS HISTOLÓGICAS ENTRE AS LEUCOPLASIAS DA CAVIDADE ORAL

Letícia Nunes de Freitas¹; Andréia Aparecida da Silva²; Heitor Albergoni da Silveira¹; Patrícia Peres Lucif Pereira³; Alessandro Antonio Costa Pereira⁴; João Adolfo Costa Hanemann⁴; Patrícia Pinto Saraiva²

¹Aluna de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade do Sagrado Coração, USC, Bauru, São Paulo. - lee-nunes@hotmail.com

²Professora Doutora, da Pós-Graduação da Universidade Sagrado Coração, USC, Bauru, São Paulo.

³Professora Doutora, da Pós-Graduação da Universidade de José do Rosário Vellano, UNIFENAS, Belo Horizonte, Minas Gerais.

⁴Professor Doutor, da Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL, Alfenas, Minas Gerais.

O objetivo foi analisar comparativamente as displasias epiteliais presentes nas leucoplasias localizadas em língua das leucoplasias que ocorrem em outros locais da cavidade oral. Estudo retrospectivo em que foram analisados 29 casos de leucoplasias bucais. Foram observadas descritivamente a morfologia das células basais, grau de displasia, presença de mitose, pleomorfismo celular, hiper cromatismo, relação núcleo citoplasma, grau de displasia. Dos 29 casos selecionados, 14 eram leucoplasias de língua e 15 eram leucoplasias de outras regiões da cavidade oral. Foi observada displasia epitelial em 09 casos de leucoplasias de língua e em 10 casos das leucoplasias de outras localizações da cavidade oral. Os graus de displasias variaram de leve a moderado. A quantidade de mitoses não foi significativa quando comparadas as leucoplasias de ambos os grupos. Independentemente do local das leucoplasias, as características histopatológicas são semelhantes, desta forma, o tratamento das leucoplasias deve ser semelhante independentemente da localização.

Palavras-chave: Leucoplasia. Cavidade oral. Displasia.