



## **AUMENTO DE COROA CLÍNICA E REABILITAÇÃO ESTÉTICA EM INDIVÍDUO COM FISSURA LABIOPALATINA. RELATO DE CASO**

Pedro Henrique Hernandes Job<sup>1</sup>; Michyele Cristhiane Sbrana<sup>2,3</sup>; Thaís Ustulin Fuzer<sup>4</sup>; Nicole Rosa de Freitas<sup>4</sup>; Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almeida<sup>3,5</sup>; Luis Augusto Esper<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Aluno do Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP. - phhjob@hotmail.com

<sup>2</sup>Prof. Dr. Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP.

<sup>3</sup>Prof. Dr. Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>4</sup>Aluna de Mestrado, Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>5</sup>Prof. Dr. Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

As fissuras labiopalatinas são deformidades congênitas que acometem a face, podendo acometer além do lábio, o rebordo alveolar e palato. O tratamento ideal das fissuras labiopalatinas envolve equipe multidisciplinar, iniciando desde o nascimento e estende-se até a vida adulta. A periodontia atua em todas as etapas da reabilitação destes indivíduos na realização do preparo inicial, procedimentos de manutenção periodontal, além de diversos procedimentos de cirurgia plástica periodontal. O propósito deste estudo foi relatar um caso clínico no qual o indivíduo com fissura labiopalatinas trans-forame incisivo de 23 anos de idade já havia realizado todos os procedimentos de reabilitação da área da fissura e estava finalizando o tratamento ortodôntico. Porém, o paciente apresentava coroas clínicas curtas e discrepâncias das margens gengivais e tamanhos dos dentes anteriores superiores, com ausência dos incisivos laterais. Foi realizado o aumento de coroa clínica na região anterior superior e após 120 dias, a realização de tratamento restaurador estético definitivo na área. O paciente ficou extremamente satisfeito com o resultado estético obtido. Assim, a periodontia pode contribuir com a finalização dos casos de reabilitação estética em indivíduos com fissuras labiopalatinas, pois é extremamente importante o equilíbrio entre estética branca e vermelha na estética do sorriso.

**Palavras-chave:** Aumento da coroa clínica. Osteotomia. Gengivectomia.