



## **RECOBRIMENTO RADICULAR E SUA PREVISIBILIDADE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A POSIÇÃO DAS PÁPILAS INTERDENTAIS: RELATO DE CASOS**

Cecy Amaral Rombaldi<sup>1</sup>; Luis Augusto Esper<sup>2,3</sup>; Guilherme Santos Moreira<sup>2</sup>; Nicole Rosa de Freitas<sup>4</sup>; Michyele Cristhiane Sbrana<sup>2,3</sup>; Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almeida<sup>3,5</sup>

<sup>1</sup>Aluna do Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP. - cecyamaralr@gmail.com

<sup>2</sup>Prof. Dr. Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP.

<sup>3</sup>Prof. Dr. Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>4</sup>Aluna de Mestrado, Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>5</sup>Prof. Dr. Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

O recobrimento das recessões gengivais é um tópico de interesse, e muito tem sido discutido quanto à previsibilidade de recobrimento com as diversas técnicas e suas variações, para obter o máximo recobrimento possível. Além disso, condições relacionadas ao indivíduo, operador, anatomia local e características da recessão podem influenciar nos resultados obtidos. Existem estudos que relatam que a posição final da margem gengival pode ser esperada, levando em consideração a análise da posição inicial ideal das papilas interdentaes. Este estudo avaliou dois casos clínicos nos quais a posição ideal das papilas no pré-operatório sugeriu a posição final da margem gengival após cirurgias de recobrimento radicular. O primeiro caso clínico tratava-se de recessão gengival Classe I de Miller tratado com enxerto de conjuntivo pela técnica de túnel, enquanto no segundo caso uma recessão gengival Classe III de Miller foi tratada com retalho posicionado lateralmente. Independente da técnica utilizada, ambos os casos foram avaliados após 60 dias. A prévia determinação da posição final da margem gengival demonstrou que pode ser útil para determinar o recobrimento radicular esperado.

**Palavras-chave:** Recessão Gengival. Enxerto. Tecido conjuntivo.