



## **TRATAMENTO DA RECESSÃO GENGIVAL COM ENXERTO DE CONJUNTIVO ASSOCIADO AO RETALHO POSICIONADO LATERALMENTE: RELATO DE CASOS**

Giulio Henrico Siniciato Casimiro<sup>1</sup>; Michyele Cristhiane Sbrana<sup>2,3</sup>; Luísa Belluco Guerrini<sup>4</sup>; Nicole Rosa de Freitas<sup>4</sup>; Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almeida<sup>5</sup>; Luis Augusto Esper<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Aluno de graduação, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado, Bauru, SP.

<sup>2</sup>Prof. Dr. Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP. - giuliosiniciato@gmail.com

<sup>3</sup>Prof. Dr. Curso de Especialização, Área de Periodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>4</sup>Aluna de Mestrado, Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

<sup>5</sup>Prof. Área de Prótese, Curso de Odontologia, Universidade de São Paulo, Bauru, SP.

As recessões gengivais são definidas como alterações no complexo mucogengival, nas quais ocorre migração apical do tecido gengival em relação à junção amelo-cementária. As recessões gengivais podem levar a prejuízos estéticos e funcionais. O tratamento cirúrgico das recessões gengivais compreende procedimentos de retalhos pediculados e os enxertos de tecido conjuntivo. O enxerto de tecido conjuntivo é considerado padrão ouro para tratamento das recessões gengivais. Este trabalho tem por objetivo relatar dois casos clínicos de tratamento de recessões gengivais, nos quais foi realizado enxerto de conjuntivo associado ao retalho posicionado lateralmente. No primeiro caso, a paciente queixava-se de sensibilidade dentinária no elemento 13, e apresentava recessão gengival Classe I de Miller. Após realização da técnica, o caso foi acompanhado por 6 anos, e a recessão totalmente solucionada com satisfação da paciente. No segundo caso clínico a paciente também queixava-se de sensibilidade dentinária do elemento 31, e clinicamente apresentava recessão gengival Classe II de Miller, e após o tratamento cirúrgico ocorreu resolução da queixa da paciente, e o caso foi acompanhado clinicamente por 1 ano. Quando bem indicada a técnica cirúrgica, o tratamento com enxerto de tecido conjuntivo propicia resultados estéticos e funcionais satisfatórios por longo prazo.

**Palavras-chave:** Recessão gengival. Enxerto. Tecido conjuntivo.