



O REBORDO ALVEOLAR COMO ÁREA DOADORA ALTERNATIVA PARA O ENXERTO GENGIVAL LIVRE

Ana Olivia Bernardi de Souza¹; Luis Augusto Esper²; Michyele C Sbrana²; Élcia Maria Varize Silveira²; Mirella Lindoso Gomes Campos; Guilherme Santos Moreira³

¹Aluna de Graduação, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP. - anaoliviabsouza@bol.com.br

²Prof. Dr. Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP.

³Prof. M.e Área de Periodontia, Curso de Odontologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru, SP. - gui_moreira8@hotmail.com

A faixa de mucosa queratinizada é uma estrutura do periodonto de proteção que se estende da gengiva marginal até a linha mucogengival, assegurando aos tecidos subjacentes uma proteção contra agressões externas e proporcionando maior estabilidade tecidual. Os enxertos gengivais livres são realizados quando não há uma faixa adequada de mucosa queratinizada, sendo o rebordo alveolar a área doadora mais comum. Este relato de caso clínico apresenta o resultado positivo de uma área doadora alternativa para o enxerto gengival livre. Uma paciente de 44 anos de idade apresentava recessões gengivais de 3 mm e 5 mm nos dentes 41 e 31 respectivamente com faixa de gengiva inserida muito estreita, o que representa um fator de risco para a progressão da recessão gengival e para a instalação de novos processos de doença, já que, nesses casos, a higiene oral pode ser dificultada. O plano de tratamento incluiu a realização de um enxerto gengival livre com o objetivo primário de criar uma faixa suficiente de gengiva inserida. A crista do rebordo alveolar de uma área posterior edêntula, na qual assentava-se uma prótese parcial removível, foi eleita como área para o tecido doador do enxerto. Em se tratando de uma região de gengiva inserida, com características clínicas e histológicas semelhantes à região receptora, possibilitou o resultado de não apenas a obtenção de uma ampla faixa de gengiva inserida, como também em tecido de coloração altamente estética. Foram observados ainda, o recobrimento radicular parcial e pouco desconforto pós-operatório. Concluiu-se que as áreas de rebordo desdentado podem se apresentar como uma alternativa viável quando comparados ao tradicional palato como área doadora para enxertos gengivais livres.

Palavras-chave: Periodontia. Rebordo alveolar. Enxerto gengival livre.